

## WICHTIGE HINWEISE

- Als Trägerlösung zur weiteren Verdünnung geeignete Lösungen sind mit ✓ gekennzeichnet.
- Die Lösungsmittel für Injektion und Infusion müssen nicht zwangsläufig übereinstimmen.
- Alle Angaben beziehen sich, falls nicht anders gekennzeichnet, auf die Anwendung bei Erwachsenen.
- In der elektronischen Verordnung sind Standards hinterlegt. Eventuelle Abweichungen von diesen Standards sind klinisch-pharmazeutisch nicht relevant.
- Zur parallelen Gabe von Medikamenten über eine Hahnenbank beachten Sie bitte Ihren jeweiligen Kompatibilitätsstandard. Die Angaben im Kompatibilitätsstandard gelten nur für die in der zugehörigen Zubereitungsliste angegebenen Konzentrationen.

| Wirkstoff<br>(Handelsname)                                                       | Injektion | Infusion                                                                             |                                                                         | Applikationszeit<br>laut Fachinformation                                    | Sonstige Hinweise                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                                                  |           | Stammlösung                                                                          | Verdünnung                                                              |                                                                             |                                                |
| <b>Aciclovir 250mg/500mg</b><br>(Aciclovir Hikma)<br>Trockensubstanz<br>Hikma    | /         | <b>A, N</b><br>250 mg: 10 ml<br>500 mg: 20 ml                                        | <b>N</b><br>250 mg: 100 - 250 ml<br>500 mg: 100 - 500 ml                | Infusion: 1 h                                                               | Keine Bolusinjektion!                          |
| <b>Amphotericin B 50mg</b><br>(Amphotericin B)<br>Trockensubstanz<br>Cheplapharm | /         | <b>A</b><br>10 ml<br>(kräftig schütteln)                                             | <b>A N G</b><br><b>×! ×! ✓</b><br>Endkonzentration:<br>0,01 - 0,1 mg/ml | Infusion: 6 h                                                               | Bei Applikation nur Filter > 1 µm<br>verwenden |
| <b>Amphotericin B liposomal 50mg</b><br>(Ambisome)<br>Trockensubstanz<br>Gilead  | /         | <b>A</b><br>12 ml<br>(mind. 30 Sek.<br>kräftig schütteln)<br>(entspricht<br>4 mg/ml) | <b>A N G</b><br><b>×! ×! ✓</b><br>Endkonzentration:<br>0,2 – 2 mg/ml    | Infusion: 30 - 60 Min.<br>(bei höheren Tagesdosen<br>auch über 2 h möglich) | Bei Applikation nur Filter > 1 µm<br>verwenden |
| <b>Anidulafungin 100mg</b><br>(Pharmore)<br>Trockensubstanz<br>Pharmore          | /         | <b>A</b><br>30 ml                                                                    | <b>A N G</b><br><b>×! ✓ ✓</b><br>100 mg: 100 ml<br>200 mg: 200 ml       | Infusion:<br>100 mg: mind. 90 Min.<br>200 mg: mind. 180 Min.                | Keine Bolusinjektion!                          |
| <b>Caspofungin 50mg/70mg</b><br>(Pharmore)<br>Trockensubstanz<br>Pharmore        | /         | <b>A</b><br>10,5 ml                                                                  | <b>A N G</b><br><b>×! ✓ ×!</b><br>50 mg: 100 - 250 ml<br>70 mg: 250 ml  | Infusion: 60 Min.                                                           |                                                |

## Auflösen parenteraler Antimykotika Virustatika

|                                                                                                                                                                                                    |          |                      |                                                                                                                                                                            |          |          |          |    |   |    |                                                             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----|---|----|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Fluconazol 200mg/400mg</b><br><b>(Fluconazol B. Braun 2mg/ml)</b><br>Infusionslösung 100 ml<br><i>B. Braun</i><br><b>(Fluconazol Kabi 2mg/ml)</b><br>Infusionslösung 200 ml<br><i>Fresenius</i> | /        | gebrauchsfertig      | <table><tr><td><b>A</b></td><td><b>N</b></td><td><b>G</b></td></tr><tr><td>✗!</td><td>✓</td><td>✗!</td></tr></table> Mischung nur über Y-Stück, keine Mischung im Behälter | <b>A</b> | <b>N</b> | <b>G</b> | ✗! | ✓ | ✗! | Infusion:<br>200 mg: mind. 10 Min.<br>400 mg: mind. 20 Min. |                       |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                           | <b>N</b> | <b>G</b>             |                                                                                                                                                                            |          |          |          |    |   |    |                                                             |                       |
| ✗!                                                                                                                                                                                                 | ✓        | ✗!                   |                                                                                                                                                                            |          |          |          |    |   |    |                                                             |                       |
| <b>Voriconazol 200mg</b><br><b>(Voriconazol Eberth)</b><br>Trockensubstanz<br><i>Eberth</i>                                                                                                        | /        | <b>A, N</b><br>19 ml | <table><tr><td><b>A</b></td><td><b>N</b></td><td><b>G</b></td></tr><tr><td>✗!</td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table> Konzentration<br>0,5 - 5 mg/ml                         | <b>A</b> | <b>N</b> | <b>G</b> | ✗! | ✓ | ✓  | 3 mg/kg KG pro Std.<br>über 1 bis 3 Std.                    | Keine Bolusinjektion! |
| <b>A</b>                                                                                                                                                                                           | <b>N</b> | <b>G</b>             |                                                                                                                                                                            |          |          |          |    |   |    |                                                             |                       |
| ✗!                                                                                                                                                                                                 | ✓        | ✓                    |                                                                                                                                                                            |          |          |          |    |   |    |                                                             |                       |

Quellen: Gebrauchs- und Fachinformationen der Hersteller (Zugriff 05/2025). Diese Information ist aus den genannten Quellen zusammengestellt und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie dient lediglich zur internen Information und ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Bei Abweichung von den Angaben in der Fachinformation (z.B. Infusionsdauer) liegt die rechtliche Verantwortung beim behandelnden Arzt.

**Legende:** A=Aqua; N=NaCl 0,9 %; G=Glucose 5%, ✓ =geeignete Trägerlösung, ✗! = ungeeignete Trägerlösung, /= entfällt, Ø = keine Daten