

Pro Karton Dantrolen i.v. mit 12 Durchstechflaschen a 20mg Dantrolen wird benötigt:

- 12 Infusionsflaschen Aqua ad inj. 100ml
- 12 Spritzen **60ml**
- 12 beliegende Filtervorrichtungen

Dantrolen i.v. 20mg wird in **60ml** Aqua ad inj. gelöst!

Informationen zur Rekonstitution und Filtration von Dantrolen i.v.

	1) Eine sterile Nadel an einer Spritze anbringen und die Spritze mit 60 ml Wasser für Injektionszwecke füllen.
	2) Eine Dantrolen i.v. Durchstechflasche mit dem Wasser in der Spritze rekonstituieren. Vorsichtig schwenken, bis sich das Pulver aufgelöst hat. Die Nadel entsorgen.
	3) Die Schutzkappe entfernen und den Dorn der Einweg-Filtervorrichtung in die Durchstechflasche einführen.
	4) Die Spritze anschließen, die gesamte rekonstituierte 60-ml-Lösung aus der Durchstechflasche in die Spritze aufziehen und die Filtervorrichtung entsorgen.
	5) Die Spritze mit der gefilterten, rekonstituierten Lösung direkt an der intravenösen Kanüle des Patienten oder an einem Verabreichungsset anbringen. Das Produkt kann abhängig von den klinischen Erfordernissen sofort oder als Infusion manuell / über eine Pumpe verabreicht werden. Die Höchstdosis ist im Abschnitt „Dosierungsanleitung“ angegeben.
	6) Die Filtervorrichtung nicht zum Übertragen der gefilterten Lösung von der Spritze zum Verabreichungsset bzw. zur Kanüle verwenden.