

Wirkstoff (Handelsname)	Injektion	Infusion		Applikationszeit laut Fachinformation	Sonstige Hinweise
		Stammlösung	Verdünnung		
Cofact 500 I.E. 20ml DFL Trockensubstanz + Lösemittel	/	i.v. A 20 ml	/	Infusion; etwa 2 ml pro Minute	Substanz löst sich innerhalb von 10 Minuten zu einer blau gefärbten Lösung
Crealb 20g Inf Lsg 100ml Infusionslösung	/	Gebrauchsfertig	A N G X! ✓ ✓	Infusion; Infusionsgeschwindigkeit muss den individuellen Umständen und der Indikation angepasst werden	Wenn große Mengen verabreicht werden, sollte das Produkt vor Verwendung auf Raum- oder Körpertemperatur erwärmt werden.
Fibrogammin 1250 I.E. Plv+Lm Dfl Trockensubstanz + Lösemittel	i.v. A 20 ml	i.v. A 20 ml	Die Fibrogamminlösung darf grundsätzlich nicht verdünnt werden.	Langsame Infusion; die Injektionsrate sollte 4 ml pro Minute nicht überschreiten	Injektion bzw. Infusion über einen separaten Zugang (im Lieferumfang enthalten); die gebrauchsfertige Lösung soll vor der Anwendung auf Raum- oder Körpertemperatur angewärmt werden.
HAEMATE P 1000 I.E. FVIII / 2400 I.E. VWF Trockensubstanz + Lösemittel	i.v. A 15 ml	/	/	Langsame Infusion; Injektions- oder Infusionsgeschwindigkeit sollte nicht mehr als 4 ml pro Minute betragen	

Haemocomplettan P 1g Plv Dfl Trockensubstanz	i.v. A 50 ml	i.v. A 50 ml	Dieses Arzneimittel darf nicht mit anderen Arznei-, Verdünnungs- oder Lösungsmitteln vermischt werden	Die Injektions- oder Infusionsgeschwindigkeit soll ca. 5 ml pro Minute nicht überschreiten.	Pulver löst sich innerhalb von etwa 5 Minuten auf (max. 15 min); rekonstituiertes Produkt sollte vor der Anwendung auf Partikel und Verfärbungen visuell überprüft werden
IG Vena 5% 10g/200ml Infusionslösung	/	Gebrauchsfertig	/	i.v. Applikation; initiale Infusionsgeschwindigkeit s. Fachinformation	Vor Verabreichung soll eine Sichtprüfung der Infusionslösung auf ungelöste Partikel und Verfärbungen stattfinden
Kybernin P 1000 I.E. Plv+Lm Dfl Trockensubstanz + Lösemittel	i.v. A 20 ml	i.v. A 20 ml	A N G Ø ✓ ✓ Verdünnungen bis 1 : 5	Die Lösung wird langsam intravenös injiziert oder infundiert (höchstens 4 ml/min).	Dopamin, Dobutamin und Furosemid sollten nicht gleichzeitig über denselben venösen Zugang appliziert werden
Privigen 10% 10g 100ml Infusionslösung	/	100 ml gebrauchsfertig	A N G Ø Ø ✓	Infusionsgeschwindigkeit siehe Fachinformation	Das Ausspülen der Infusionsschläuche mit physiologischer Kochsalzlösung oder 5 %iger Glukoselösung ist erlaubt.
Rhophylac 300µg 2ml Fsp Injektionslösung in Fertigspritzen	i.m i.v gebrauchsfertig	/	/	/	BMI > 30 → intravenöse Verabreichung

Uman Big 180 I.E. 1ml Dfl Injektionslösung	i.m. gebrauchsfertig	/	Dieses Arzneimittel darf nicht mit anderen Arzneimitteln gemischt werden.	/	Während der Lagerung kann sie leichte Trübungen oder kleine Mengen an Partikeln aufweisen.
Wilate 500I.E. VWF / 500I.E. FVIII Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer intravenösen Injektionslösung	i.v. A + 0,1 % Polysorbat 80 5 ml	/	/	Art der Anwendung siehe Fachinformation, Rücksprache mit der Gerinnungsambulanz laut Substitutionsplan	Cave: Beigefügte Injektions- /Infusionsset verwenden
Wilate 1000I.E. VWF / 1000I.E. FVIII Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer intravenösen Injektionslösung	i.v. A + 0,1 % Polysorbat 80 10 ml	/	/	Art der Anwendung siehe Fachinformation, Rücksprache mit der Gerinnungsambulanz laut Substitutionsplan	Cave: Beigefügte Injektions- /Infusionsset verwenden

Legende: A=Aqua; N=NaCl 0,9 %; G=Glucose 5%, ✓=geeignete Trägerlösung, ✗! = ungeeignete Trägerlösung, /= entfällt, Ø = keine Daten