

Leitung:

Dr. rer. nat. Thomas Vorwerk, M.A.
Chefapotheker

Zeichen: Bi
Durchwahl: 0511 927-6516
Telefax: 0511 927-6525
E-Mail: nikola.bielefeld@krh.eu

Datum: 05.01.17

An all Ärzte und Pflegekräfte

**Umstellung von Clarithromycin (Klacid) 500mg i.v. auf Azithromycin 500mg
Azithromycin 500mg i.v.**

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Beschluss der AMK ist Clarithromycin 500mg (Klacid®) i.v. nun nicht mehr gelistet und wurde durch Azithromycin Eberth 500mg i.v. ersetzt.

Wichtige Anwendungsinformationen zu Azithromycin:

- Dosierungsintervall: 1x/d
- Therapiedauer Ambulant erworbene Pneumonie : 3d (S3- LL 02/16: bei klinischer Stabilisierung und keinem Nachweis atypischer bakterieller Erreger Makrolid max. 3d)
- geringstes Interaktionspotenzial innerhalb der Makrolide
- niedrigste kardiovaskuläre Toxizität wird diskutiert
- keine Anpassung bei NI/LI
- bei Schwangeren mit Adnexitis: Einmalgabe

Trotz des gleichen Wirkstoffgehalts wird das Azithromycin bei gleicher Indikation anders dosiert:

Präparat	Clarithromycin 500mg i.v.	Azithromycin 500mg i.v.
Dosierung ambulant erworbene Pneumonie	2 x täglich	1 x täglich

Bitte beachten Sie diese Information bei der Verordnung.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen, Ihr Zentralapothekenteam