

Umsetzung einer Entscheidung der Arzneimittelkommission

Die Kommission hat beschlossen, nach Abgabe des Apothekenvorrates der **Roxithromycin 300mg Tabletten** nur noch **Azithromycin 500mg Tabletten** vorrätig zu halten.

Die beiden Antibiotika unterscheiden sich insbesondere in der Wirkdauer und können deshalb nicht 1:1 umgesetzt werden.

	Azithromycin 500mg Tbl	Roxithromycin 300mg Tbl
SAP.-Nr.	74503	97878
Normdosis Erwachsener	Unkomplizierte Chlamydia trachomatis: 1 g als Einmaldosis; alle anderen Indikationen: 1,5 g Gesamtdosis, verteilt auf 3 Tage mit jeweils 500 mg (alternativ auch über 5 Tage: 500 – 250 – 250 – 250 – 250 mg)	1 x 300 mg pro Tag (alternativ 2 x 150 mg pro Tag) maximale Einnahmedauer: 4 Wochen
Dosisanpassung	Bei GFR < 10 ml/min oder schwerer Leberinsuffizienz mit Vorsicht	Bei schwerer Leberinsuffizienz Halbierung der Dosis
Kinderbehandlung	Ab 45 kg KG möglich	Ab 7 kg KG möglich
Einnahmezeitpunkt	Zu einer Mahlzeit	Vor einer Mahlzeit

Weitere Informationen zur Applikation oder Pharmakologie können unter der Telefonnummer 0511 927-6602 (Arzneimittel-Info-Telefon) erfragt werden.

Ihr Zentralapothekenteam